



# PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

**Problemele care pot să apară din cauza porcilor sau a cărnii și produselor din carne contaminate cu virusul pestei porcine africane**

- Procurarea porcilor neidentificați și lipsa certificatului veterinar sporesc riscul apariției cazurilor de pestă porcină africană;
- Întreținerea porcilor în spații îngrădite, utilizarea de haine și încălțăminte aparte pentru îngrijirea porcilor, precum și spălarea riguroasă a mâinilor și utilizarea dezinfectantelor (ecocid, clorură de var), limitează posibilitatea îmbolnăvirii porcilor;
- Hrănirea porcilor cu cereale (porumb ș.a.) proaspăt recoltate sau cu iarbă poate provoca îmbolnăvirea acestora, astfel recomandăm depozitarea acestora pe o perioadă de cel puțin 30 de zile;
- Persoanele care au participat la vânătoare nu trebuie să contacteze cu porcii cel puțin 48 de ore;
- Mistreții sau carnea acestora pot transmite virusul pestei porcine africane la porcii domestici;
- Prin prepararea termică a cărnii în gospodărie, virusul pestei porcine africane **NU SE DISTRUGE;**
- **Carnea congelată poate transmite boala ani în șir;**
- **Sărarea, afumarea și condimentarea nu distrug virusul pestei porcine africane;**
- Subprodusele și lăturile rezultate în urma preparării cărnii în gospodărie cresc pericolul transmiterii bolii prin utilizarea lor în hrana porcilor;
- Carnea vândută sau oferită rudelor poate transmite boala în alte gospodării sau localități;
- Păstrarea cărnii potențial infectate face posibilă oricând reapariția bolii în gospodării.



**ÎN CAZUL ÎMBOLNĂVIRII PORCILOR SAU DEPISTĂRII CADAVRELOR DE PORCI DOMESTICI SAU MISTREȚI  
INFORMAȚI IMEDIAT AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR,  
MEDICUL VETERINAR SAU PRIMARUL LOCALITĂȚII.**